



PLAATJESBOEK

TER VISUELE
ONDERSTEUNING
VAN HET GESPREK



VOORWOORD

Het digitale plaatjesboek is in samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland ontwikkeld en gedigitaliseerd. De animaties dienen ter visuele ondersteuning van het gesprek met de cliënt.

Feedback van patiënten uit Eritrea, Nepal, Gambia, Polen en Nederland is verzameld evenals de input van verschillende zorgverleners.

Dit is een uitgave van:

KNCV Tuberculoseonds
Den Haag, augustus 2019

© KNCV Tuberculosefonds
Gebruik (niet-commercieel) van gedeelten van deze uitgave in huidige vorm is toegestaan, mits dat gebeurt met bronvermelding en aansluit bij bovengenoemd voorlichtingsdoel. Overig gebruik in overleg met KNCV.

INHOUD

03 Verschil LTBI & TBC
Ingezoomd op LTBI

05 Soorten tbc

06 Hoe raak je besmet?

07 Hoe raak je niet besmet?

08 Symptomen
Afvallen
Nachtzweeten
Hoesten
Vermoeidheid
Verminderde eetlust
Koorts

14 Onderzoek
Huidtest (THT)
Bloedtest (IGRA)
Longfoto
Laboratorium

18 Behandeling
Medicatie
Bijwerkingen

21 Begeleiding
DOT
VOT

23 Hoesthygiëne
Zakdoek
Elleboog

25 Isolatie
Thuis
Huisbezoek
Buitenlucht
Ziekenhuis
GGD
Openbare ruimte

31 BCG-vaccinatie

33 BCO - ringprincipe

34 Privacy

VERSCHIL LTBI & TBC



De afbeelding laat het verschil tussen een gezond persoon, iemand met tuberculose-infectie en de zieke tuberculose zien.

De man met het groene shirt is volledig gezond.

De man met het oranje shirt is besmet met de slapende tuberculosebacterie. Hij merkt hier niets van. Hij is ook niet besmettelijk voor anderen.

De man met het rode shirt heeft de zieke tuberculose ontwikkeld. Hij heeft klachten zoals hoesten (soms met bloed), koorts, moeheid, afvallen en nachtzweeten.

INGEZOOMD OP LTBI



De afbeelding laat iemand met tuberculose-infectie zien.

SOORTEN TBC



Open en gesloten tbc.

HOE RAAK JE BESMET?



Hoe raak je besmet?

Tuberculose wordt overgebracht door hoesten en niezen. Door hoesten en niezen worden heel kleine vochtdruppeltjes vanuit de longen naar buiten gebracht. Deze wolk van druppeltjes kan de tuberculosebacteriën bevatten bij een patiënt met open longtuberculose. Wie deze bacteriën inademt loopt risico op een infectie. Mensen met open longtuberculose kunnen andere mensen besmetten.

In de afbeelding hoest de vrouw aan de linkerkzijde druppeltjes met de tuberculosebacteriën uit. Het kind op schoot en de jongeman aan de rechterzijde van de afbeelding ademen de tuberculosebacteriën in.

HOE RAAK JE NIET BESMET?



TBC is niet aan anderen te geven door: bestek van elkaar gebruiken, elkaar een hand geven of zoenen.

SYMPTOMEN: AFVALLEN



SYMPTOMEN: NACHTZWETEN



SYMPTOMEN: HOESTEN



SYMPTOMEN: VERMOEIDHEID




SYMPTOMEN: VERMINDERDE EETLUST



SYMPTOMEN: KOORTS



ONDERZOEK: HUIDTEST (THT)




De huidtest is een test die aantoont of er afweerstoffen tegen tuberculosebacteriën in het lichaam aanwezig zijn. Voor de huidtest wordt een klein beetje vloeistof in de huid van de buitenzijde van de linker onderarm gespoten.

ONDERZOEK: BLOEDTEST (IGRA)



De bloedtest is een test die aantoont of er afweerstoffen tegen tuberculosebacteriën in het lichaam aanwezig zijn. Voor de bloedtest worden een of meer buisjes bloed afgenomen.

ONDERZOEK: LONGFOTO



Op de longfoto kan de dokter zien of de persoon de ziekte tuberculose heeft gekregen.



Zien hoe de
longfoto wordt gemaakt?
Bekijk [hier het filmpje](#)
'[Instructiefilm](#)
[röntgenonderzoek](#)'.

ONDERZOEK: LABORATORIUM



Microscoop met bacteriën.

BEHANDELING: MEDICATIE



Medicatie nemen op vast tijdstip.



Geen alcohol.

BIJWERKINGEN: MEDICATIE



Urine, ontlasting of zweet/traanvocht kunnen rood/oranje worden. Dat kan geen kwaad.

BIJWERKINGEN: MEDICATIE



Jeuk en of uitslag kunnen een gevolg zijn van medicatie.

BEGELEIDING: DOT



DOT: pillen met glas water gegeven door zorgverlener.



22 Plaatjesboek

HOESTHYGIENE: PAPIEREN ZAKDOEK



Voorbeeld goede hoesthygiëne - met gebruik van een papieren zakdoek. De zakdoek na gebruik wegwerpen bij het normale afval.

HOESTHYGIENE: ELLEBOOG



Voorbeeld goede hoesthygiëne - hoesten in de elleboogplooi en met afgewend hoofd.

ISOLATIE: THUIS



Isolatie - Patiënt thuis zonder mondkapje.

ISOLATIE: HUISBEZOEK



Isolatie - Hulpverlener die een mondkapje op heeft en bij de patiënt thuis op bezoek is.

ISOLATIE: BUITENLUCHT




Isolatie - Patiënt in park zonder mondkapje.

ISOLATIE: ZIEKENHUIS



Isolatie - Patiënt met mondkapje bij arts in het ziekenhuis.

ISOLATIE: GGD



Isolatie - Patiënt met monkapje bij de ggd.

ISOLATIE: OPENBARE RUIIMTE



Isolatie - Patiënt met mondkapje buiten op weg
naar ...kerk...supermarkt...apotheek... moskee.

BCG-VACCINATIE: BABY



Plaatsen BCG-vaccinatie baby

BCG-VACCINATIE: KIND




Plaatsen BCG-vaccinatie kind

BRON- EN CONTACT- ONDERZOEK: RINGPRINCIPE



Bij patiënten met longtuberculose onderzoekt de GGD eerst of de huisgenoten en andere personen met wie de patient veel in contact is geweest besmet zijn geraakt. Wanneer dat zo is worden ook andere contacten onderzocht.

PRIVACY



Dossier client wordt niet zonder medeweten gedeeld met derden.